

1 ვარიანტი  
 ერთეული – 1000 ფრთა  
 სუკების პერიოდი – 60 დღე  
 ფრინველის რაოდენობა – 925 ფრთა

ცელადი დანახარეები  
 საკვების ღირებულება:  
 60 დღეზე 1-ფრთაზე საჭიროა 5,3 კგ-ი საკვები  
 შემდეგი პროპორციით:

1. ხორბალი 0,7კგ. 60 თეთრი – 42 თეთრი
  2. ხიმინდი 1,9კგ. 60 თეთრი – 1.14 თეთრი
  3. ქერი 1,4კგ. 90 თეთრი – 1.26 თეთრი
  4. პრემიუმი 1,0. 2,10 თეთრი – 2.10 თეთრი
  5. მარილი-ვარვი 0,3. 0,01 თეთრი – 0,03 თეთრი
- სულ: 4,95 თეთრი

წიწილების შეძენა 1000. 1,5=1500 ლარი  
 სხვა დანახარეები: მომვლელის ხელფასი,  
 ვეტ. მომსახურება, წყალი, ელ. ენერჯია, სატრანსპორტო  
 ხარჯები, რემონტი 600 ლარი.  
 დანახარჯები სულ 1000 ფრთაზე 6678 ლარი  
 რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა  
 9250 ლარი.

მარჯინალური მოგება 2572 ლარი



მე-2 ვარიანტი  
 (ბოლო პერიოდში გამოვლენული მეთოდი)  
 ერთეული 1000 ფრთა  
 სუკების პერიოდი 42 დღე  
 ფრინველის რაოდენობა 925  
 ცელადი დანახარეები:  
 1. საკვების დანახარეები:  
 ხიმინდი 2,8კგ. პრემიუმი 1,2კგ.  
 სულ საკვებზე დანახარეები 4403 ლარი  
 2. წიწილის შეძენა 1500 ლარი  
 3. ხელფასი, ვეტ. მომსახურება, წყალი,  
 ელ. ენერჯია 600 ლარი  
 სულ დანახარეები 6503 ლარი  
 რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა  
 9250 ლარი

მარჯინალური მოგება 2747 ლარი



ა(ა)თი აგროსერვის ცენტრის  
 კონსულტანტი  
 შალვა ანანიძე –  
 ძ. ბათუმი 599 89 89 61

მისამართი: საპარტოვო, ბათუმი, 6010,  
 ი. გომეგაშვილის ქუჩა № 46  
 გვლ.: +995 (422) 27 96 02  
[www.agroc.ge](http://www.agroc.ge)  
 მხელმი ხაზი: +995 599 54 89 84



**ბროილერი**



**მეხორცილე ქათმის (ბროილერის)  
მოვლა-შენახვა  
მარინალური მოვების მოკლე კომენტარი**

ბროილერის წიწილას ზრდა-განვითარებისათვის დიდი პოტენციალი გააჩნია, რის საფუძველზეც 36-დღის ასაკში 1.6-1.9 კგ-ს აღწევს. ამიტომ გამოზრდა დაკვლამდე არ უნდა აღემატებოდეს 60 დღეს, ვინაიდან მატულობს ერთეულ პროდუქციასზე დასახარებელი.

ბროილერის წიწილას ზრდა-განვითარების ყველაზე მაღალი ზრდის ეტაპია აქვს. პირველი 2-თვის განმავლობაში, ბროილერი მიღებულია სპეციალიზირებული მეხორცილე ქათმის შეყვარების გზით. ბროილერის ბინაში გამოზრდის დროს განათების ხანგრძლივობა დღე-ღამეში უნდა იყოს არანაკლებ 17-სათობა.

წიწილი ბროილერებისათვის დასმის ხიშიდროვე უნდა იყოს 10-15 ფრთა 18კვ-ზე, ხოლო კარგი ფრტილაივის პირობებში 14-18 ფრთა.

ბროილერის წიწილამ 2-თვის ასაკში რომ მიღწიოს დასაკლავ წონას (1.5-2კგ) გადაწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება სრულფასოვან კვებას.

ბროილერის წიწილი პირველ დღეებში შეიძლება გველებით მისარმული ვერცხვით, წმინდად დაღერილი მარცვლეულით, 20 დღის ასაკიდან შეიძლება შეიყვანოს მისარმული კარტოფილით და შერეოთ მარცვლეულის ღერძილი ცილივან საკვებთან ერთად. კარტო მთვებს მოხდილი რძე, დო, შრატო, ხაჭო, მცენარეული საკვებიდან ცილებით მდიდარია სითი, მზესუმზირას და არახიხის კოპტონი და შრატო. შეიძლება მიეცეთ სხვა საკვებთან შერეული დაკვილი მჭეანე მასა 6-გრამის ოდენობით, ზამთარში კი ხალახის ფქვილი, ჭრისღერძილი.

ვიტამინებით მდიდარ საკვებს წარმოადგენს სატილო რომელიც წარვები შეიძლება მიეცეთ 5-7დღის ასაკიდან 3-5გრამი, 5-დღიდან კი მიეცეს A-მეტაკამინი. წიწილისათვის აუცილებელია

მინერალური წივიორებები: ცარცი, ბელის

ფქვილი რომელიც 5-დღის ასაკიდან უნდა მიეცეს, ასევე უნდა მიეცეს მჭიერ ზომის(2-5 მილიმეტრანი) კვანძები. ეს ხელს უწყობს კვლის კუთხების მოქმედებას და 3-ჯერ ზრდის საკვების, გამსაკუთრებით მარცვლეულისათვისებას.

100 ფრთაზე კვირამი ერთხელ საკვებში უნდა შეურიოთ 200-500 გრამი კვში მარგამ ჭეიმა არ არის რეკომენდირებული. კვშიწალადის დაავადების თავიდან აცილების მიზნით კვირამი 3-4ჯერ კალიუმის პერმანგანატის (მარგანეოფოვოვის ხსნარით) დაწვერება. ბროილერის კვებისას მიღებულია ნებაზე კვება.

**ბროილერის კვება**

ბროილერის ასაკი	საკვების რაოდენობა დღე-ღამეში გრ.
1-5	15
6-10	20
11-20	45
21-30	65
31-40	85
41-57	100
57-60	115



აღნიშნული კვება გამსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სუცების პირველი 4 - კვირის განმავლობაში. ამ პირობების დაცვით 1 თვეში წიწილის წონამ შეიძლება მიღწიოს 700-900 გრამს. ბროილერის სუცების დროს გამსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ტემპერატურულ რეჟიმს. 7-დღის ასაკამდე ბინაში ტემპერატურა უნდა იყოს +26 +28 ერთი თვის ასაკში კი +19-20°C

ბროილერის წიწილების დაავადების პროფილაქტიკა

ჭირი - საშიში ვირუსული დაავადება, მისი პროფილაქტიკა ხდება სავალდებულო აცრების საშუალებით, კერძოთი ვეცხვით.

პულორიზი - დაავადებული წიწილი იწყებს ჯდომას, თვალები აქვს მახვირად დახუჭული, გამწვანებული სუნთქვა, განავალი თეთრი მსაფერი

სუნით. დაავადების გამომწვევია: სიმქიდროვე, ნესტი, დაუხალწესელი საკვებით კვება, განსაკუთრებით ვიტამინებით დეფიციტი. სამკურნალოდ გამოიყენება: ტეტრაციკლინი, ლევომიცეტინი, ფურაცილინი, კანამიცინი, სულფადიმეზინი.

პროფილაქტიკა - წიწილი უნდა იზრდებოდეს იზოლირებულად, მკაცრად უნდა დავიყვათ ჰიგიენა, ჩატარდეს დეზინფექცია 20% კირის ხსნარით, უნდა მიეცეთ მარგანეოვოცა, საკვები გავამდიდროთ ვიტამინებით.

საღმონელოზი - წიწილები ავადდებიან 1-დან 3-4 თვის ასაკამდე. დაავადების დროს წიწილები აღარ მოძრაობენ, უწყებათ კვლის ამლილობა მძაფრი სუნით.

მკურნალობა-ტეტრაციკლინი საკვებში მიეცემათ, 10%-იანი ენროფლოქსი წყალთან ერთად მიეცემა 1გრ - 2ლიტრ წყალში. ოქსიტეტრაციკლინი ეძლევათ 20 დღეზე ასაკის წიწილებს 1ფრთაზე 2-3 მილიგრამი, მუკაგორი 1კგ - 5ლიტრ წყალში.

პროფილაქტიკა - დაავადებული წიწილები გამოიყვით ცალკე. ჩატარდეს დესინფექცია, ინფერარი და საგნები გაირეცხოს ცხელი წყლით, ვებრილით ხისტამატურად მღრღნელებს.

კოქსიდოზი - ავადდება მზარდი 2-6 კვირის ასაკში. წიწილებს უცვიფიფენად მადა, საკლუბად მოძრაობენ, ეშლებათ კუკი, განავალი მჭეანე ან წითელი ფერისაა სწრაფად იკლებს წონაში.

მკურნალობა - ამპრულოუმი 20%-იანი 1გრ-1,5ლიტრ წყალში 5-7 დღის განმავლობაში, კოქსიდოლოგიტი-2,5გრ 0,5ლიტრ წყალში.

როცკოცინი 10კგ საკვებში 5 გრამი, ერთ დღიან სუცების მიუღ კერიდები.

პროფილაქტიკა: მხეილი ფრინველისაგან იზოლაცია. ბინის ყოველდღიური დასუფთავება, საკვებურებისა და საწვერებლების ხისტამატურად ცხელი წყლით გაირეცხვა, სრულფასოვანი საკვებით დევიტამინებით კვება.

მეხორცილე ქათმის (ბროილერის) მარინალური მოვების ანგარიში